

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.

"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on:
facadm16@gmail.com

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.



Généralités sur les fractures

A. BENBOUZID


Il s'agit d'un cours d'introduction sur la pathologie traumatologique destiné aux externes en médecine.

Au cours de l'enseignement qu'ils auront lors de leur stage en traumatologie, toutes les notions seront développées et explicitées au fur et à mesure des différents cours.

Qu'est-ce qu'une fracture ?

Une fracture interrompt la continuité d'un segment du squelette.

Une fracture est la rupture de la continuité osseuse dyaphysaire ou métaphysaire ou épiphysaire selon le siège



Circonstances

L'appareil osseux est une charpente solide.

Elle peut subir un dommage dans les circonstances suivantes :

- **Accidents de la route (polytraumatisé)**
- **Accidents du travail (chute d'un lieu élevé, écrasement, etc....)**
- **Pratique sportive**
- **Chutes banales lors de la déambulation (personnes âgées)**
- **Accident domestique**
- **Coups et blessures**
- **Plaies par armes à feu (traumatisme balistique)**

La cause peut être :

Traumatique :

Coup direct

Ecrasement

Brusque mouvement de torsion

Contraction musculaire extrême

Pathologique : (spontanément sur un os fragilisé)

Maladies héréditaires

Maladies métaboliques

Tumeurs osseuses primaires ou secondaires.

De fatigue : à la suite d'une multitude d'efforts répétés sur un os

Mécanismes

Traumatismes directs dans lesquels la lésion survient au niveau du point d'impact. Ils donnent lieu à :

- Fractures transversales, comminutives
- Contusions, lésions des parties molles

Traumatismes indirects dans lesquels la lésion survient à distance du point d'impact. Ils donnent lieu à :

- Fractures spiroïdes par torsion

Nombres de fractures

Polytraumatisme : blessure grave à plusieurs lésions dont une au moins met en jeu le pronostic vital

Polyfracture : au moins 3 fractures

Traumatisme étagé : au moins 2 fractures sur la même partie, sur le même membre



Association lésionnelle : syndrome du "tableau de bord" ou chute élevée

Une fracture est définie:

- par son siège***
- par les traits de fracture (direction)***
- par le nombre des fragments et leur déplacement***

Siège

épiphysaire
métaphysaire
diaphysaire



Siège

Fracture épiphysaire

C'est une fracture articulaire qui peut endommager la morphologie et la cinétique articulaire.

Fracture métaphysaire

Elle se trouve dans une zone où siège le cartilage de conjugaison responsable de la croissance en longueur de l'os. De ce fait, elle peut entraîner une épiphysiodèse (soudure du cartilage) partielle ou totale.

Fracture diaphysaire

Elle siège au niveau du corps de l'os

Traits de fractures

F. incomplète

Elle ne rompt pas toute la circonférence osseuse

Fracture en bois vert: une seule corticale
est rompue, l'autre est simplement infléchie

Fracture en motte de beurre

F. complète

Transversale

Oblique courte ou longue

Spiroïde

Engrênée

Comminutive

Tassement

Déplacement

Angulation

Plan frontal

- Valgus
- Varus



Plan sagittal

- Flessum
- Recurvatum

Translation

Chevauchement

Décalage




Décollement épiphysaire

- Le trait siège au niveau du cartilage de conjugaison
- Le décollement peut être pur ou arracher un fragment épiphysaire, métaphysaire ou les deux (selon la classification de Salter et Harris)



Fracture transversale simple



Fracture transversale avec fragment en « aile de papillon »




Fracture spiroïde par torsion



Le déplacement est parfois important
Des fragments menacent la peau

Fracture comminutive




Chocs directs

Lésions cutanées


Lésions des parties molles

(muscles, vaisseaux, nerfs)

Fracture à double étage





Fracture métaphyso-épiphysaire comminutive



Fracture épiphysaire (articulaire)



Fracture par tassement



Fracture en bois vert



Fracture en motte de beurre



Fracture engrenée du col du fémur




Fracture de fatigue



Fracture de fatigue typique des 3
métatarsiens moyens


Fracture pathologique




Stabilité

- Une fracture est dite **stable** lorsqu'une fois réduite et immobilisée, elle n'est pas susceptible de se déplacer
- A l'inverse, une fracture est dite **instable** lorsqu'elle garde sa forme une fois réduite et immobilisée
- Ainsi :
- Les fractures stables sont : F. transversale simple, F. engrenée,
- Les fractures instables sont : F. oblique, F. spiroïde, F. comminutive, F. à double foyer


Evolution d'une fracture (Phases de la consolidation)




Phase de l'hématome
périfracturaire et de
l'inflammation
(J 20)



Constitution du
cal conjonctif
(J 20 à 30)



Ossification du cal
(J 30 à J 60)



Phase d'ossification
Le cal conjonctif
devient cal osseux

5^{ème} étape : phase de modelage
phase de modelage qui rend à l'os sa forme originelle

Consolidation osseuse : le cal



Facteurs qui retardent la consolidation osseuse

- L'âge
- La localisation à la diaphyse
- L'ouverture cutanée
- L'évacuation de l'hématome péri-fracturaire
- L'immobilisation insuffisante du foyer
- L'interposition musculaire
- L'infection

Signes cliniques lors d'une fracture

Douleur

Impotence fonctionnelle

Déformation :

- Raccourcissement

- Déviations

- Rotation du membre

Signes locaux :

- Œdème ou tuméfaction des tissus

- Ecchymose

- Hématome

La mise en évidence d'une complication liée à la fracture doit être portée à la connaissance du blessé et mentionnée sur le dossier médical

Radiographie

Elle confirme le diagnostic et précise les caractères anatomiques de la fracture

L'examen radiographique d'une diaphyse fracturée doit montrer *systématiquement* les articulations sus et sous jacentes.

Complications et lésions associées

Complications immédiates ou précoces:

Elles surviennent le jour même

Complications secondaires:

Elles surviennent dans les jours qui suivent la fracture

Complications tardives:

Elles surviennent dans les mois, voire les années qui suivent la fracture

Complications précoces

Lésions cutanées

Lésions vasculaires

Lésions nerveuses

Embolie graisseuse

Infection

Ouverture cutanée

de dedans en dehors
de dehors en dedans

Risque septique

3 stades : CAUCHOIX et DUPARC (après parage chirurgical)

- **Type I** : Ouverture punctiforme ou linéaire sans décollement ni contusion , facile à suturer.
- **Type II** : Plaie avec contusion des berges. Suture possible sous tension . Risque de nécrose cutanée secondaire.
- **Type III** : Perte de substance cutanée. Suture impossible.




Broiement de membre

Risque de « crush injury »



Exposition des fragments fracturés après nécrose cutanée



Lésions vasculaires

Font suite à :

Une contusion : thromboses

Une compression

Une rupture d'un vaisseau



Lésions nerveuses

Par compression ou section par l'os fracturé

Elongation

Rupture partielle ou franche

Troubles sensitifs (paresthésies)

Troubles moteurs (paralysie)

Neurapraxie : Simple sidération nerveuse. Récupération totale en 21 jours

Axonotmesis : Rupture de la gaine axonale. Récupération 1mm par jour

Neurotmesis : Rupture totale du nerf. Aucune récupération

Infections



Ostéite post-opératoire



Infection à anaérobies

Complications secondaires

Générales :

- Décompensation des tares sous-jacentes
- Complications thrombo-emboliques
- Complications liés au décubitus
- Embolie graisseuse

Locales :

Orthopédique :

- Déplacement secondaire
- Compression vasculo-nerveuse

Chirurgicale :

- Problème de cicatrice
- Infection nosocomiale
- Nécrose

Embolie graisseuse

- Obstruction du réseau micro-circulatoire par des micro-gouttelettes de graisses insolubles. ☐
- Fractures des os longs dans 90 % des cas
- Atteinte Pulmonaire (98% cas)
- Manifestations neurologiques
- Manifestations cutané-muqueuses (pétéchies, fond d'œil)



Complications tardives

Au niveau du foyer :

Cal vicieux

Pseudarthrose et retard de consolidation

Infection tardive

Au niveau articulaire :

Raideur

Arthrose

Au niveau musculaire :

Amyotrophie

Troubles trophiques résiduels :

Ostéoporose

Algodystrophie

Consolidation vicieuse



Consolidation vicieuse



Cal vicieux en valgus et en recurvatum



Cal vicieux en chevauchement

Consolidation vicieuse



Cal vicieux en :

Valgus

Recurvatum

Décalage (Rotation)

Consolidation vicieuse



Cal vicieux en varus du tiers distal du tibia

Consolidation vicieuse



Décalage externe



Varus

Consolidation vicieuse



Cal vicieux en :
Translation externe
Chevauchement

Pseudarthrose (PSD)



Pseudarthrose du tibia après
ostéosynthèse par plaque vissée



Pseudarthrose hypertrophique du péroné
Le tibia a été traité par clou

Pseudarthrose




PSD hypertrophique en « patte d'éléphant »



PSD atrophique en « queue de radis »

Algodystrophie post-traumatique

Survenant après traitement
chirurgical



ou orthopédique



Traitements

Traitement orthopédique




Fractures non déplacées :

Contention plâtrée

Fractures déplacées :

la réduction permet de remettre les fragments osseux dans leurs rapports anatomiques de façon manuelle ou instrumentale (traction)





Botte plâtrée simple transformée en botte de marche

Fractures sans déplacement




Confection d'une attelle plâtrée simple




Confection d'un plâtre circulaire

Fractures déplacées

Réduction manuelle du déplacement puis plâtre




Traitement orthopédique des fractures



Traction au lit sur attelle


Traitement d'attente (contre-indication temporaire à l'opération)

Rarement traitement complet



Traction collée (chez le jeune enfant)

Réduction sur cadre de TRILLAT




Broche dans le calcaneum ou étrier de traction

Genou fléchi à 45°

Contrôle de l'alignement obtenu par radioscopie F et P

Confection d'un plâtre circulaire en flexion

Ablation de la traction




Plâtre cruro-pédieux

Le 1er plâtre est changé au bout de 45 jours pour un autre en flexion du genou de 10 à 15°

Correction d'un éventuel déplacement

Gypsotomie



En cas de déplacement, on peut faire une **gypsotomie** : corriger la déformation par des manipulations et fixer par une câle provisoire

Contrôle radioscopique


Quand l'alignement est obtenu, on ajoute des tours de bandes de plâtre

Nouveaux contrôles à J8 et J15

Précautions - Surveillance d'un plâtre



Surélévation du membre





Pas de plâtre trop serré !!

Plâtre serré ?

Principes généraux :

- Bien garnir l'intérieur d'un plâtre
- Fendre **systématiquement** les plâtres circulaires pour permettre l'expansion et l'élargissement en cas de besoin





Phlyctènes sous plâtre

Prévenir le syndrome de Volkmann !


Rétraction ischémique des fléchisseurs

annoncée par :

Douleurs de l'avant -bras

Fourmillements des doigts

Oedème



Déformation avérée

- Flexion du poignet
- Hyperextension des MP
- Flexion des IPP

Traitements chirurgicaux

Lésions osseuses :

Ostéosynthèse interne ou externe

Lésions cutanées :

Sutures, greffes

Ostéosynthèse




Exemples d'ostéosynthèse commentés
























Remplacement prothétique



Fixateur externe (Fractures ouvertes)



Chirurgie plastique de recouvrement

Lambeau vascularisé (pédiculé ou libre)



Traitement pour une fracture comminutive de la jambe au tiers moyen avec ouverture de stade II

Parage, lavage, drainage aspiratif
Fermeture cutanée sans tension
Ostéosynthèse par fixateur externe
Sérothérapie ATT et vaccination
Traitement antibiotique



Traitement des pseudarthroses



Greffe osseuse prélevée sur
la crête iliaque



